

# 蠅蛆病

蠅蛆病是由蒼蠅幼蟲（蠅蛆）入侵人體或脊椎動物的器官及組織所引起的疾病。經常臥床、身體殘障或缺乏自我照顧能力的長者，較易受蠅蛆入侵沒有皮膚保護的身體部位（如傷口及黏膜）。



## 病原體

很多種類的蒼蠅都可以引致人類或動物的蠅蛆病，如狂蠅科、麗蠅科及麻蠅科等。在香港，麗蠅科的蛆症金蠅是常見引致蠅蛆病的品種。

## 蠅蛆病的形成

蛆症金蠅的生命周期包括四個階段，即卵、幼蟲、蛹和成蟲。雌蠅成蟲只會在活的動物身上產卵，產卵位置通常為病弱人士身體表面的傷口，及口、耳及鼻等孔穴的黏膜。蟲卵一般於24小時之內孵化成幼蟲，而幼蟲會鑽入宿主的身體組織內，以進食宿主的壞死或活組織為生。

## 病徵

蠅蛆鑽入宿主的身體組織及其進食行為會對宿主的身體組織造成嚴重損害，感染部位通常流出惡臭的分泌物及出現潰爛，導致器官機能失調、皮膚受損、繼發性細菌感染以至死亡。

## 預防方法

要預防蠅蛆病，市民（特別是易受感染人士的照顧者及安老院舍的職員在照料院友時）應採取以下措施：

### • 保持良好的個人衛生

- 每天洗澡及保持皮膚清潔
- 保持口腔衛生



### • 妥善處理傷口

- 所有傷口應及時妥善處理及包紮好。處理傷口前、後須潔淨雙手
- 定時評估傷口情況及保持敷料乾爽清潔
- 如懷疑傷口感染或長期未能癒合，應盡早求診

### • 保持良好的環境衛生

- 保持居住地方清潔
- 把食物貯存於雪櫃內，或用紗網遮蓋食物
- 垃圾應放入有緊密蓋子的垃圾箱內並定時清倒
- 動物屍體必須妥善棄置



### • 防蠅措施

- 安裝防蠅網、昆蟲電殛裝置或滅蠅燈

### • 寵物的照料

- 所有動物傷口應及時妥善處理
- 寵物，尤其是狗隻應定時接受獸醫檢查
- 如懷疑動物患有蠅蛆病，應送交獸醫治理
- 不要飼養流浪動物

安老院舍的員工應確保院舍有良好的衛生環境；留意院友有否出現蠅蛆病之病徵，並盡快安排不適院友就醫。

如欲獲得更多有關防治蒼蠅的資料，可向食物環境衛生署轄下的防治蟲鼠事務諮詢組查詢。



衛生防護中心網站

[www.chp.gov.hk](http://www.chp.gov.hk)

衛生署健康教育專線

2833 0111

鳴謝：屯門醫院提供蛆症金蠅的成蟲及幼蟲之相片

二零一九年十二月修訂