

中東呼吸綜合症－醫療環境的感染控制概要

及早檢測和監測

- 鑑於中東呼吸綜合症冠狀病毒的出現及其嚴重性，如病人出現急性呼吸道病徵和發燒，應多加留意外遊紀錄及有相關流行病學聯繫。
- 如個案符合呈報準則，必須呈報衛生防護中心。
- 呈報準則：<https://ceno.chp.gov.hk/casedef/casedef.pdf>
- 呈報表格：
<http://www.chp.gov.hk/tc/notification/13/33.html>

防護措施

- 處理疑似或確診病人時，應施行標準、接觸和空氣傳播防護措施。

個人防護裝備

- 處理疑似或確診病人時應佩戴 N95 呼吸器、護目裝備，保護衣和手套。
- 嚴遵手部衛生及個人防護裝備的穿著與卸除程序。
- 進行高風險霧化醫護程序時，應注意安全，嚴遵安全措施。請參閱：
http://www.chp.gov.hk/files/pdf/chinese_ic_matrix.pdf

分流站

- 員工應佩戴適當的個人防護裝置包括 N95 呼吸器/外科口罩*、護目裝備、保護衣和手套。
(*於分流站工作的醫護人員可根據風險評估而佩戴外科口罩)

病人隔離

- 隔離病人在空氣傳播隔離病房內。當沒有可作單獨隔離的房間時，群集相同病因的患者在同一區域內。
- 確診病人不應與疑似病人在同一地方護理。

手部衛生

- 應使用酒精搓手液潔手。如雙手有可見污漬，應用規液及清水潔手。

樣本收集及運送

- 收集樣本時應施行標準、接觸和空氣傳播防護措施。
- 應依照基本的三重包裝方式妥善包裝臨床樣本，以防止於運送時洩漏。

病人運送

- 病人應佩戴外科口罩，員工亦應佩戴適當的個人防護裝備。

環境清潔

- 應每日最少以 1,000ppm 稀釋漂白水清潔及消毒環境兩次，尤其是經常接觸表面及或可見污垢時。
- 患者出院後，需進行終期消毒。

醫療儀器清潔

- 應提供患者專用儀器。
- 醫療儀器應進行清潔及消毒才可再次使用。
- 應使用洗便盆機消毒便盆和便壺。

床單被服和洗衣房

- 應立即放入污衣袋並包紮妥當，亦應避免晃動。
- 用過的被服一律列為傳染性被服。污衣袋須繫上「傳染性被服」標籤。

廢物處置

- 病人產生的所有廢物均為醫療廢物，需棄置在紅色醫療廢物膠袋。
- 處理醫療廢物時，員工應佩戴適當個人保護裝置。

行政支援

- 管理部門應確保資源充足。為探訪者和患者發出相關指引及張貼適當標誌。
- 監察有病徵員工情況。
- 員工若有呼吸道或肺炎症狀，應盡快向主管報告。

(最後更新日期為二零一五年六月九日)