

2014/15 年度院舍防疫注射計劃 疫苗的參考資料

(1) 季節性流感疫苗

在院舍防疾疫注射計劃2014/15年度提供的疫苗包括以下成分：

- 類甲型/加利福利亞/7/2009 (H1N1)pdm-09 病毒
- 類甲型/德克薩斯/50/2012(H3N2)病毒
- 類乙型/麻薩諸塞/2/2012 病毒
- 類乙型/布里斯本/60/2008 病毒

製劑

年齡組別	劑量	裝備
36 個月或以上	0.5 毫升疫苗	一支預先裝滿的注射器連針咀
6 個月至 35 個月	0.25 毫升疫苗	一支預先裝滿的注射器(不連針咀) 加 一支分開提供的針咀 (注射前須將注射器連接分開提供的針咀)

注射劑量、方法和部位*

醫生會為接種人士於上臂三角肌中央部位的肌肉內／大腿前外側（嬰幼兒）進行肌肉注射。至於出血病症患者或服用薄血藥的人士，需注意減低出血的機會。接種 Fluarix™ Tetra 時可考慮採用皮下深層注射以減低出血的風險。而 FluQuadri™ Quadrivalent Influenza Vaccine 只可透過肌肉注射。接種前應作個別評估以平衡疫苗的益處和潛在風險。如有任何疑問，請向負責到診註冊醫生查詢。

年齡	劑量	劑次
36 個月或以上	0.5 毫升疫苗	一*
6 個月至 35 個月	0.25 毫升疫苗	一*

*註：凡九歲以下從未接種過流感疫苗的兒童，均須接種兩劑疫苗，而兩劑疫苗接種時間須至少相隔四星期；在2013/14年度或以前曾接種季節性流感疫苗的9歲以下兒童，在2014/15年度只需接種一劑疫苗。

誰不宜接種滅活季節性流感疫苗？

對曾接種的滅活流感疫苗或其他疫苗成分有過敏反應的人士，都不宜接種滅活季節性流感疫苗。如欲瞭解疫苗成份，請參考藥盒內說明書。例如，**Fluarix™ Tetra** 含有 **慶大黴素 (Gentamicin)**。對雞蛋有輕度過敏的人士可於基層醫療接種滅活流感疫苗，而確診或懷疑對雞蛋有嚴重過敏反應的人士，應先由過敏學／免疫學專科醫生就雞蛋敏感進

行評估，並因應臨牀需要，由過敏學／免疫學專科醫生接種滅活流感疫苗。如接種當日因病發燒，可延遲至病癒後才接種疫苗。

(2) 肺炎球菌疫苗 (23vPPV)

「院舍防疫注射計劃」所使用的肺炎球菌疫苗，乃「23 價肺炎球菌多醣疫苗」，含有 23 種類型的肺炎球菌抗原，包括：1-5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F 及 33F。

製劑

一支預先裝滿 0.5 毫升疫苗的注射器連針咀。

注射劑量

0.5 毫升疫苗

注射劑次

在「2014/15 年度院舍防疫注射計劃」下，對於 65 歲及以上人士，科學委員會建議接種一劑 13 價肺炎球菌結合疫苗或一劑 23 價肺炎球菌多醣疫苗。對於那些有額外高風險的情況下，可根據醫生臨床判斷考慮是否在第一次接種五年後再接再種一次肺炎球菌疫苗。請與醫生商討。

注射方法和部位

醫生會為接種人士於上臂三角肌中央部位的肌肉內進行注射。而對於容易出血的人士或服用薄血藥人士，醫生會考慮採用深層皮下注射方法。如有任何疑問，請向負責到診註冊醫生查詢。

哪些人不適合接種 23vPPV

如曾在接種 23vPPV 後或對該疫苗的成分出現嚴重過敏反應，則不應繼續接種。

23 價肺炎球菌多醣疫苗應否在某些醫療程序前或後接種

在許可的情況下，應在進行脾臟切除手術前最少兩週完成 23 價肺炎球菌多醣疫苗接種。在進行癌症化療或電療期間不應接種 23 價肺炎球菌多醣疫苗。

(3) 疫苗保存方法

- 經常保存在攝氏+2 至+8 度的雪櫃內，避免燈光直接照射。
- 切勿貯存於冰格內，如疫苗曾結冰，請勿使用，並立即通知本署。
- 為確保雪櫃內的溫度合乎標準，應在雪櫃內設置溫度計，並每天早、晚檢查並記錄在「貯存疫苗的雪櫃溫度檢查表」上，及作出適當的調校。