

การติดเชื้อไวรัส B

ตัวแทนเชิงสาเหตุ

ไวรัส B (หรือที่เรียกว่า ไวรัสเรมซิเมีย) เป็นไวรัสเรมซิเมตชนิดหนึ่งที่มักพบในหมู่มแมคคาที่เป็นลิงป้าชนิดหนึ่งที่พบทั่วไปในฮ่องกง ไวรัส B อยู่ในน้ำลาย, ปัสสาวะ, และอุจจาระของแมคคาเวด้วยธรรมชาติ แมคคาที่ติดเชื้อส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการหรือมีอาการป่วยเล็กน้อย

การติดเชื้อไวรัส B ในมนุษย์นั้นหายาก โดยมีผู้คนประมาณ 50 คนที่ได้รับการติดเชื้อทั่วโลกตั้งแต่ปี 1932 การติดเชื้อในมนุษย์ถูกรายงานในสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, จีนแผ่นดินใหญ่และญี่ปุ่น โดยส่วนใหญ่เกิดจากการถูกกัดหรือขีดข่วน

ทางคลินิก คุณสมบัติ

ผู้ติดเชื้ออาจมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในตอนแรกเช่นมีไข้, และหนาวสั่น, ปวดกล้ามเนื้อ, เมื่อยล้าและปวดหัวแผลที่ผิวหนังในถุงน้ำอาจเกิดขึ้นที่บริเวณที่ถูกกัดหรือรอยขีดข่วนเมื่อโรคดำเนินไปโดยไวรัสสามารถแพร่กระจายไปยังระบบประสาทกลางส่งผลให้เกิดความเจ็บปวด/ความชา/ความคัน ใกล้เคียง, ปัญหาเกี่ยวกับการประสานงานของกล้ามเนื้อ, ความเสียหายที่เกิดขึ้นในระบบประสาทและผลเชิงรุนแรงที่สุดคือการเสียชีวิต

วิธีการส่งผ่าน

การติดเชื้อในมนุษย์ส่วนใหญ่เกิดจากการถูกกัดหรือขีดข่วนโดยลิงที่ติดเชื้อในขณะที่การแพร่เชื้อจากมนุษย์สู่มนุษย์เป็นเรื่องที่หายากมาก

ระยะฟักตัว

อาการมักเกิดขึ้นภายใน 1 เดือนหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการสัมผัส

การจัดการ

การติดเชื้อในมนุษย์ต้องมีการจัดการทางการแพทย์อย่างมืออาชีพ

การป้องกัน

เพื่อลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อไวรัส B ขอแนะนำให้ประชาชนทราบสิ่งต่อไปนี้:

1. อยู่ห่างจากลิงป้าและหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือให้อาหาร
2. ในกรณีที่มีบาดแผลที่เกิดจากลิงให้ล้างแผลด้วยน้ำไหลปริมาณมากและเรียกร้องการรักษาทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน

ประชาชนทั่วไปสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของการเกษตรกรรมประมงและอนุรักษ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเมื่อเผชิญหน้ากับลิง:

www.afcd.gov.hk/english/conservation/con_fau/con_fau_nui/con_fau_nui_str/con_fau_nui_str.html

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรด

ไปที่เว็บไซต์ www.chp.gov.hk ของศูนย์คุ้มครองสุขภาพ

5 เมษายน 2024 (5 April 2024)