


蠅蛆病



蠅蛆病是由蒼蠅幼蟲（蠅蛆）侵擾人體或脊椎動物的組織所引起的疾病。經常臥床、身體殘障或缺乏自我照顧能力的長者，較易受蒼蠅入侵沒有皮膚保護的身體部位，如傷口及黏膜等，而受到其幼蟲侵擾。

病原體

很多種類的蒼蠅都可以引致人類或動物的蠅蛆病，如狂蠅科等。在香港，麗蠅科的蛆症金蠅是其中一種最常見引致人類蠅蛆病的品種。

蠅蛆病的形成

蛆症金蠅於生長週期中會經歷卵、幼蟲、蛹至成蟲四個階段。雌蠅成蟲只會在活的動物身上產卵（包括溫血動物和人類），產卵位置通常為病弱人士身體表面的傷口，及口、耳及鼻等孔穴的黏膜。蟲卵一般於24小時之內孵化成幼蟲，而幼蟲會鑽入宿主的身體組織內，以進食宿主的血液以及壞死或活組織為生。蠅蛆病並不會經人與人之間傳播。

病徵

蠅蛆進食時會鑽入宿主身體，對宿主的身體組織造成嚴重破壞，引致皮膚受傷、繼發性感染、器官機能失調、甚至死亡。皮膚受傷部位通常流出惡臭的分泌物及出現潰爛。

預防方法

要預防蠅蛆病，市民（特別是易受感染人士的照顧者及安老院舍的職員）應採取以下措施：

1 保持良好的個人衛生

- ▶ 每天洗澡及保持皮膚清潔。
- ▶ 保持口腔衛生。

2 妥善處理傷口

- ▶ 傷口流出的液體及血液會吸引蛆症金蠅，所以任何傷口應及時妥善處理及包紮好。處理傷口前、後必須潔淨雙手。



- ▶ 定時評估傷口情況及保持敷料乾爽清潔，避免吸引蛆症金蠅產卵。
- ▶ 如發現有任何發炎徵狀，例如出血、有異味分泌物或含膿等，應盡快通知醫護人員處理。

3 保持良好的環境衛生及保持空氣流通

- ▶ 保持居住地方清潔。
- ▶ 把食物貯存於雪櫃內，或用紗網遮蓋食物。
- ▶ 垃圾應放入有緊密蓋子的垃圾箱內並定時清倒。
- ▶ 動物屍體必須妥善棄置。

4 防蠅措施

- ▶ 透過安裝各種防蠅措施，例如防蠅網、蚊帳、防蠅簾、昆蟲電殛裝置或捕蠅器，可防止蚊蠅滋生。

5 寵物的照料

- ▶ 寵物，尤其是狗和貓，應定時接受獸醫檢查。
- ▶ 所有動物傷口應即時妥善處理。
- ▶ 如懷疑動物患有蠅蛆病，應送交獸醫治理。
- ▶ 不要飼養流浪動物。

安老院舍的員工應確保院舍有良好的環境衛生；留意院友有否出現蠅蛆病的病徵，並盡快安排不適院友就醫。

如欲獲得更多有關防治蒼蠅的資料，可瀏覽食物環境衛生署網頁

https://www.fehd.gov.hk/tc_chi/pestcontrol/arthropod-pests-leading.html



衛生防護中心網站

www.chp.gov.hk

衛生署健康教育專線

2833 0111

二零二四年五月修訂