



大專生篇

# 揭穿飲酒禍害



# 不再受騙

科學研究並未發現真正有效的解酒方法!

坊間流傳的解酒方法大多缺乏科學依據。一些解酒藥（加維他命、阿司匹林）僅能短暫舒緩宿醉的部分症狀。最有效的避免宿醉方法是完全不飲酒。

世界衛生組織  
從沒建議以「適量」飲酒

保護心臟！適量飲酒對心臟是否有保護作用仍具爭議，過量飲用紅酒與其他酒一樣會傷害心臟，可引致心臟病。為了保護心臟而飲用已證實可致癌的酒精，值得嗎？

飲酒易面紅與否  
並不代表甚麼！

飲酒面紅與體內一分解酒精的酵素（乙醛脫氫酶，acetaldehyde dehydrogenase）有關。缺乏此酵素者，身體因難以分解酒精而較易酒後面紅，然而，這不可用來判斷飲酒的量是否有超過身體承受能力。

飲酒不能減壓！

酒精會刺激下丘腦激素釋放，令人更易感到壓力。壓力越大，飲得越多，造成惡性循環，可能引致酗酒。

# 酒的禍害

世界衛生組織指出：  
導致每年全球約

# 3,300,000

## 人死亡！

引致 **200** 多種疾病和損傷，  
包括酒精依賴、精神病、肝硬化、  
肝炎、中風、心臟病、癌症...



健康肝



硬化肝

- 與煙草一樣，是**第一類致癌物**，可引致口腔癌、咽喉癌、食道癌、肝癌、大腸癌、女性乳癌。
- 任何致癌物都沒有安全攝取量，**少量飲酒都有患癌風險**，飲得越多，風險越大。

還造成其他嚴重問題，包括醉酒鬧事、家庭暴力、性侵犯、車禍...

在香港，

- 2012年，共2,376人因酒精問題而入院
- 2012年，因司機飲酒而導致的交通意外共43宗

## 威士忌溝綠茶醉青的士猝死

一名24歲青年，凌晨與友人於旺角酒吧歡聚時，疑飲下大量「黑牌威士忌溝綠茶」，他帶醉獨自乘的士返家途中昏睡，青年送院後不治。該青年有吸煙飲酒習慣及平日少運動，有醫生懷疑他因冠心病發或急性酒精中毒致死。

(明報 11/01/2013)



## 醉酒女跳橋命危

一名滿身酒氣的女子，昨清晨在街頭與男友爭執後，疑情緒失控大發脾氣，赤腳狂奔衝上行人天橋，一躍而下飛墮十米下的馬路，情況危殆。

(東方日報 09/02/2014)

## 19歲青年醉死

一名19歲青年加班後與友人到酒吧消遣，於凌晨扶醉回家休息。八小時後被胞兄發現昏迷床上，全身冰冷，面部和身體發黑，有失禁痕迹。救護員到場後證實死亡。(太陽報 23/10/2012)

## 兩醉青偷小巴狂飆被捕

兩名18歲學生昨凌晨疑酒醉鬧事，偷走一輛小巴「揸大膽車」，先連撞六部停泊之的士，狂飆五公里後掃斷五條鐵柱及一個水龍頭，再撞向大樹才停下。二人最後被捕。

(星島日報 31/12/2011)

## 4少年 涉輪姦醉酒女街坊

大埔一名女子疑接受在寓所樓下回收場工作的4名少年邀約喝酒，最終不勝酒力醉倒，少年涉送女子回家後乘虛而入，將其輪姦，4人同被控一項強姦罪。(明報 23/06/2013)



## 醉駕殺好老師 司機酒精超標2倍

一名體內酒精超標2倍的醉駕司機，昨晨疑高速爬頭時失事衝上行人路。一名正徒步返回附近學校的老師走避不及，被撞飛至數米外，當場死亡。司機涉酒後駕駛及危險駕駛導致他人死亡兩宗罪，被帶署保釋候查。

(經濟日報 25/12/2009)

## 酗酒夫鐵鎚扑妻

一名妻子為養家而打兩份工，卻被有酗酒習慣的丈夫懷疑她有外遇。丈夫趁妻子返家小休時用鐵鎚扑頭襲擊，令她頭部裂傷，顴骨骨折。(蘋果日報 10/08/2013)



酒精對身體的影響因人而異，與年齡、性別、新陳代謝率、體形和身體結構、腸胃裡的食物份量、飲酒的速度和份量，以及服用藥物的情況等有關。總括而言，任何人都不宜飲酒。



## 飲酒有損青少年腦部發展

研究顯示：

- 長期使用酒精的青少年記性較差
- 酒精是青少年大腦發展過程中的神經毒素，影響神經發育及行為控制
- 12 歲以下開始飲酒的青少年日後較有可能因飲酒而作暴力行為或受傷，或缺課
- 18 歲以下開始飲酒的青少年於成年後較有可能濫用或依賴酒精，而愈早（15歲以下）開始飲酒，風險愈高。

成績表

10  
8  
0  
6

## 過量飲酒可致暴斃

暴飲

- 一次過飲用至少5罐/杯酒
- 可導致車禍、暴力行為、不安全性行為、酒精中毒…
- 研究顯示暴飲的青少年有較差的學習表現及較多的健康風險行為





### 酒精中毒

- 飲酒過量令血液內酒精濃度太高，使神經系統中負責維持呼吸、心跳、體溫等的部分停止運作，可導致突然死亡
- 徵狀：精神錯亂、昏迷、嘔吐、抽搐、呼吸困難、皮膚變青、面色蒼白



### 飲酒可以致肥

- 每克純酒精約含有7 卡路里，是空泛熱量，不提供任何營養
- 1 罐啤酒(330毫升) = 142 卡路里 = 大半碗飯 = 約7粒方糖
- 另外，酗酒會阻礙營養吸收，導致缺乏維他命B1、B2、B6、B9、C...

## 飲酒相關法例

### 食肆

處所須領有牌照始可售賣酒類，而持牌人不得准許任何18歲以下的人在任何領有牌照處所飲用令人醺醉的酒類。

### 酒後駕駛

若駕駛者被發現體內酒精含量超過法定限度，將會被起訴



法定限度	刑罰
每100毫升血液內含50毫克酒精；或 每100毫升呼氣內含22微克酒精；或 每100毫升尿液內含67毫克酒精	<ul style="list-style-type: none"><li>• 最高可被判處罰款港幣25,000元及監禁3年；</li><li>• 強制修習駕駛改進課程；</li><li>• 記10分違例駕駛記分；</li><li>• 停牌處分。</li></ul>



## 酒精害人，開車前味飲

### 駕駛前可以飲多少酒？

每個人吸收酒精的程度各有不同，沒有方法可計算飲多少酒會超過法定限度。**最安全的做法是駕駛前滴酒不沾。**

# 向酒精說 不

樹立正確的心態：我有權利不飲酒，不飲酒不會傷害到真正朋友之間的感情

選擇適合自己的朋友圈

主動要一些非酒精飲品，並說明自己不飲酒的理由或用合適的理由婉拒



## 測試你的飲酒狀況

### 1 你有幾經常飲含有酒精的飲料？

- 從不     每月少≤1次     每月2-4次     每星期2-3次     每星期≥4次
- 0分      1分                  2分                  3分                  4分

### 2 在你飲酒的日子裡，通常一日會飲多少個酒精單位的酒（1罐啤酒/ 1杯餐酒/ 1 peg烈酒）？

- 1-2     3-4                   5-6                   7-9                   ≥10
- 0分      1分                  2分                  3分                  4分

### 3 你有幾經常一次過飲至少5罐啤酒/5杯餐酒/5 peg烈酒？

- 從不     每月<1次     每月1次     每星期1次     幾乎每日或每日
- 0分      1分                  2分                  3分                  4分

每條題目分數為0-4分；  
如總分≥3即表示為有害  
飲酒，可能需要專業人士  
的協助。



### 輔導服務

1. 東華三院「遠酒高飛」酗酒治療計劃  
電話：2884 9876  
網址：<http://atp.tungwahcsd.org/>
2. 東華三院「心瑜軒」（多重成癮輔導）  
電話：2827 1000  
網址：<http://icapt.tungwahcsd.org/>
3. 屯門酗酒治療所  
電話：2456 8260  
網址：<http://www3.ha.org.hk/cph/ch/services/at.asp>

### 相關資料

你可透過以下途徑索取更多相關的健康資訊：  
衛生署「活出健康新方向」  
網站[www.change4health.gov.hk](http://www.change4health.gov.hk)

